




MASTER

 RSUD Dr. SOEDARSO	MEMBERIKAN OBAT SUPPOSITORIA		
	No. Dokumen : 04/065/022/AK- RSDS/2017	No.Revisi : 04	Halaman : ½
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Januari 2017	Ditetapkan Direktur  Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP. 19620328198910 1 001	
PENGERTIAN	Memberikan obat-obatan secara secara abius .		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pengobatan 2. Untuk mengurangi rasa sakit 3. Untuk memperlancar buang air besar 		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUD Dr. Soedarso No.115 tahun 2017 tentang Kebijakan Standar Prosedur Keperawatan Dalam Pelayanan Keperawatan.		
PROSEDUR PELAKSANAAN	<p>A. Pre interaksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek order di dalam catatan integrasi atau lembar unit dispensing dose 2. Cuci tangan 3. Siapkan obat dengan prinsip 7 benar. 4. Siapkan alat-alat <ol style="list-style-type: none"> a. Obat suppositoria sesuai order b. Sarung tangan c. Baki/nampan/trolley d. Piala ginjal e. Pengalas/pelak f. Pispot (bila perlu) g. Unit dispesing dose (UDD) <p>B. Tahap Orientasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan salam, panggil pasien dengan namanya dan periksa gelang identitas pasien. 2. Jelaskan prosedur, tujuan, dan lamanya tindakan pada pasien/keluarga. <p>C. Tahap Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan kesempatan pasien bertanya sebelum kegiatan dilakukan. 2. Menanyakan riwayat alergi 3. Jaga privacy pasien 4. Menyiapkan obat sesuai order 		

 RSUD Dr. SOEDARSO	MEMBERIKAN OBAT SUPPOSITORIA		
	Nomor Dokumen : 04/065/022/AK- RSDS/2017	Nomor Revisi 04	Halaman 2/2
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pasang penalas, buka pakaian pasien 6. Atur posisi pasien dengan posisi sim kiri (sesuaikan kondisi pasien) 7. Pakai sarung tangan. 8. Buka bungkus obat. 9. Masukkan obat melalui anus secara perlahan dan anjurkan pasien tarik napas. 10. Tahan obat dengan kasa sampai obat masuk secara keseluruhan. 11. Anjurkan pasien untuk tidak bergerak selama \pm 5 menit. 12. Untuk bentuk cair masukan kanul tube ke dalam anus sesuai ukuran, tekan botolnya sampai cairan habis masuk kemudian tarik kanul tersebut dengan posisi botol tetap tertekan. 13. Rapiakan kembali pakaian dalam pasien dan berikan posisi senyaman mungkin, anjurkan 10 menit tidak turun dari tempat tidur. 14. Angkat pengalas. 15. Merapikan klien 16. Mengembalikan alat pada tempatnya <p>D. Tahap terminasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil kegiatan dan observasi adanya alergi. 2. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya 3. Akhiri kegiatan 4. Cuci tangan <p>E. Dokumentasi</p> <p>Catat tindakan yang telah dilakukan di lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) dan di lembar unit dispensing dose (UDD) dan tulis nama dan paraf oleh petugas dan keluarga pasien.</p>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Intensif 4. Instalasi Rawat Inap Khusus 5. Instalasi Gawat Darurat 6. Instalasi Farmasi 		